

# 辽宁革螨的生态地理分布

李维贤

(辽宁省卫生防疫站, 沈阳 110005)

**摘要** 辽宁省已知的革螨46种, 分属于5科19属。本文依据四个不同地理景观区内革螨的优势种、常见种和罕见种, 对其生态地理分布作了讨论。(1)辽西低山丘陵及沿海平原区: 本区共有革螨20种, 其中仓鼠真厉螨、格氏血厉螨为优势种; 塔山巨刺螨、长毛鞘厉螨为罕见种。(2)辽东山地及半岛丘陵区: 本区共有革螨22种。半岛丘陵革螨优势种为仓鼠真厉螨、格氏血厉螨; 辽东山地革螨优势种为耶氏厉螨与东方真厉螨。本区罕见种为赛氏血革螨、达呼尔血革螨、大连防刺螨、三角血厉螨等。(3)辽河平原区: 本区共有革螨20种。优势种为耶氏厉螨与厩真厉螨; 乌苏里土厉螨为罕见种。(4)努鲁儿虎山脉北麓黄土丘陵台地及西辽河沙地区: 本区共有革螨26种。优势种为东北血革螨、仓鼠真厉螨及格氏血厉螨。巨腹棘刺螨、鼬棘刺螨、拟小棘刺螨、半漠血厉螨、乌苏地厉螨、北野血革螨、楠本血革螨等为罕见种。

**关键词** 辽宁革螨 生态地理分布

辽宁革螨种类分布问题, 曾先后有张兴旺(1962)、戴显声等(1963)作过报道, 但调查工作仅局限于沿海和交通要道地带, 报道的种类最多达20余种。在《中国经济昆虫志》中也仅记录辽宁革螨24种(潘综文等, 1980)。

自1964年以来, 我们在自然疫源性疾病的调查中, 于多种地理景观生境内以鼠类(包括其窝巢)为主要调查对象, 对我省革螨种类分布进行了较为全面调查。根据1964—1986年在我省28个县(市)的调查, 获革螨5科19属46种。有些种类如毒厉螨、格氏血厉螨等为广布种。而多数种类的分布受自然地理条件和鼠类地理分布的一定影响。

毒厉螨为褐家鼠(*Rattus norvegicus*)的主要寄生革螨, 其分布随着褐家鼠在辽宁的广泛分布而成为广布种。格氏血厉螨宿主广, 家栖鼠类褐家鼠, 田野栖的黑线仓鼠(*Cricetulus barabensis*)、黑线姬鼠(*Apodemus agrarius*)、草原栖的达乌尔黄鼠(*Citellus dauricus*)、五趾跳鼠(*Allactaga sibirica*)等, 固定与半固定沙丘栖的小毛足鼠(*Phodopus roborovskii*)、三趾跳鼠(*Dipus sagitta*)、直至半树栖的花鼠(*Eutamias sibiricus*)、均有格氏血厉螨寄生, 因而遍布全省。

根据地形地貌、土壤、植被等自然地理条件及鼠类的地理分布, 将全省划分为四个地理小区(表1), 依据各区内革螨的优势种、常见种及罕见种, 对辽宁省革螨的生态地理分布讨论如下。

一、辽西低山丘陵及沿海平原区 本区除沿海平原及台地外, 海拔多在300—500m。年降雨量400—500mm。低山丘陵多为灌丛和草坡, 森林面积很小。沿海平原、台地及丘陵坡地多为农田。鼠类有黑线仓鼠、达乌尔黄鼠、大仓鼠(*Cricetulus triton*)、社鼠(*Rattus niviventer*)、岩松鼠(*Sciurotamias davidianus*)、花鼠、褐家鼠、小家鼠(*Mus mu-*

sculus) 等。其中黑线仓鼠为优势种。

本区有革螨 20 种(表 1)。仓鼠真厉螨、格氏血厉螨为优势种。仓鼠真厉螨宿主较广,有黑线仓鼠、达乌尔黄鼠、大仓鼠等。据在锦西县对 32 只黑线仓鼠体带革螨的调查(1974),共获革螨 103 只,其中仓鼠真厉螨 86 只,占革螨总数的 83.5%;格氏血厉螨 13 只,占 12.6%;其它革螨仅 4 只,占 4.0%。

本区多数革螨为一般常见种,而寄生于马铁菊头蝠的塔山巨刺螨、寄生于金龟子的长毛鞘厉螨仅在本区内采收。

二、辽东山地及半岛丘陵区 本区东北部是由长白山脉向南延续部分构成的中山山地,海拔多在 500m 以上,西南部为海拔 300—500m 的半岛丘陵。雨量较多,气候湿润。植被自东北向西南由针阔混交林逐步过渡为阔叶杂木林直至灌丛草地。山间河流谷地,尤其是鸭绿江三角洲一带为大片水稻田,丘陵坡地多开垦为农田,半岛丘陵南部有大面积果园。鼠的种类较多,有黑线姬鼠、黑线仓鼠、大仓鼠、东方田鼠 (*Microtus fortis*)、大林姬鼠 (*Apodemus speciosus*)、棕背鼯 (*Clethrionomys rufocanus*)、花鼠等。除林带外,优势种为黑线姬鼠与黑线仓鼠。

本区有革螨 22 种(表 1)。半岛丘陵西南沿海一带以仓鼠真厉螨、格氏血厉螨为优势种,这里鼠类的优势种为黑线仓鼠。东北部山地则以耶氏厉螨、东方真厉螨为优势种,这里鼠类的优势种是黑线姬鼠。据在清原县的调查统计(1978),自黑线姬鼠共获革螨 1273 只,其中耶氏厉螨 614 只,占革螨总数的 48.2%;东方真厉螨 322 只,占 25.3%;其它革螨 337 只,占 26.5%。

赛氏血革螨、达呼尔血革螨、大连肪刺螨、三角血厉螨等仅在本区内采收。

三、辽河平原区 本区除北部稍高外,海拔多在 50m 以下,地貌较为单纯,是由辽河及其支流冲积而成的平原,是辽宁主要产粮区。鼠类主要为农田型种类,优势种为黑线姬鼠与黑线仓鼠。

本区共有革螨 20 种(表 1)。优势种为耶氏厉螨与真厉螨。据在铁岭县的调查统计(1982),对采自 121 只黑线姬鼠体的 193 只革螨的分类统计,耶氏厉螨 94 只,占获革螨总数的 48.7%;真厉螨 59 只,占 29.0%;格氏血厉螨 18 只,占 9.3%;其它革螨共 25 只,占 13.0%。对采自 74 只黑线仓鼠体 102 只革螨的分类统计,真厉螨 63 只,占革螨总数的 61.8%;耶氏厉螨 21 只,占 20.6%;格氏血厉螨 14 只,占 13.7%;其它革螨 4 只,占 3.9%。

本区内个别水域中有麝鼠 (*Ondatra zibethica*) 栖息,自该种鼠采到多刺厉螨。1981 年曾于该区内的昌图县一东方田鼠窝巢内采到乌苏里土厉螨。这两种革螨仅在本区内采收。

四、努鲁儿虎山脉北麓黄土丘陵台地及西辽河沙地区 本区位于辽宁省的西北。其与内蒙赤峰地区相接壤的努鲁儿虎山脉北麓黄土丘陵台地,少雨干旱,年降雨量 400mm 左右,植被属于干草原型,现多已开垦为农田。彰武、康平、昌图三县与内蒙通辽地区接壤地带,系西辽河风沙灌丛草原南部边缘地带,大片的丘间甸地多已开垦为农田。这两种景观内的鼠类多为干草原与沙地型种类,有达乌尔黄鼠、黑线仓鼠、五趾跳鼠、草原鼯鼠 (*Myospalax aspalax*)、小毛足鼠、三趾跳鼠、长爪沙鼠 (*Meriones unguiculatus*) 等。达

表 1 辽宁省革螨

[illegible]

名录及分布

		辽河平原区							努鲁儿虎山脉北麓 黄土丘陵台地及西 辽河沙地区					主 要 宿 主	
15 新宾	16 清原	17 黑山	18 新民	19 沈阳	20 辽阳	21 鞍山	22 大洼	23 铁岭	24 建平	25 阜新	26 彰武	27 康平	28 昌图		
+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	褐家鼠、社鼠	
														小家鼠	
								++						麝 鼠	
+++	+++		++	++	++	++	+++	+++						黑线姬鼠、黑线仓鼠、大林姬鼠、大仓鼠	
									+		+			三趾跳鼠、小毛足鼠	
+														大仓鼠	
++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	黑线仓鼠、达乌尔黄鼠、黑线姬鼠、褐家鼠等	
									+		+	+		小家鼠、黑线仓鼠、达乌尔黄鼠等 窝巢	
											+			小毛足鼠、三趾跳鼠	
			+	+				+						东方田鼠、黑线姬鼠	
														云斑鳊金龟	
++	++								++	++	++			黑线仓鼠、达乌尔黄鼠	
									+	+				黑线仓鼠	
													+	东方田鼠	
							++	++	++	++	++			黑线仓鼠、大仓鼠	
						+								缺齿鼯	

种 名	辽西低山丘陵及沿海平原区					辽东山地及半岛丘陵区								
	1 兴 城	2 锦 西	3 锦 县	4 北 镇	5 北 票	6 长 海	7 大 连	8 金 县	9 复 县	10 盖 县	11 宽 甸	12 凤 城	13 本 溪	14 桓 仁
17. 脂刺血革螨 <i>Haemogamasus liponyssoides</i>											++	++	++	++
18. 阿尔泰扎氏血革螨 <i>Haemogamasus zachvatkini altaicus</i>														
19. 达呼尔血革螨 <i>Haemogamasus dauricus</i>												+		
20. 赛氏血革螨 <i>Haemogamasus serdjukovae</i>												+		+
21. 北野血革螨 <i>Haemogamasus kitanoi</i>														
22. 楠本血革螨 <i>Haemogamasus kusumotoi</i>														
23. 东北血革螨 <i>Haemogamasus mandschuriensis</i>														
24. 新真厉螨 <i>Eulaelaps novus</i>														
25. 仓鼠真厉螨 <i>Eulaelaps cricetuli</i>	+++	+++	+++	+++	+++		+	++	++	++				
26. 东方真厉螨 <i>Eulaelaps dongfangis</i>													+++	+++
27. 厩真厉螨 <i>Eulaelaps stabularis</i>	+	+								+				
28. 巨腹棘刺螨 <i>Hirstionyssus ventricosus</i>														
29. 淡黄棘刺螨 <i>Hirstionyssus isabellinus</i>														
30. 鼯鼠棘刺螨 <i>Hirstionyssus sunei</i>		+							+					
31. 仓鼠棘刺螨 <i>Hirstionyssus criceti</i>	++	++						++		++				
32. 鼯鼠棘刺螨 <i>Hirstionyssus musculi</i>		+	+								+	+		

续表 1

		辽河平原区							努鲁儿虎山脉北麓 黄土丘陵台地及西 辽河沙地区					主 要 宿 主	
15 新宾	16 清原	17 黑山	18 新民	19 沈阳	20 辽阳	21 鞍山	22 大洼	23 铁岭	24 建平	25 阜新	26 彰武	27 康平	28 昌图		
++	++						++	++							黑线姬鼠
		++									++				东北鼯鼠、草原鼯鼠
															大仓鼠、黑线仓鼠
															棕背鼯
									+		+		+		黑线仓鼠、达乌尔黄鼠
									+	+			+		黑线仓鼠
		++							+++	+++	+++	+++	+++		达乌尔黄鼠、黑线仓鼠、五趾跳鼠、东 北鼯鼠、小毛足鼠
									+						达乌尔黄鼠、五趾跳鼠
									+++	+++	+++				达乌尔黄鼠、黑线仓鼠、五趾跳鼠 大仓鼠、小毛足鼠
+++	+++		++	++	++			++							黑线姬鼠、黑线仓鼠
			+++	+++				+++							黑线仓鼠、大仓鼠
									++		++				草原鼯鼠
								+							黑线姬鼠
								+							褐家鼠、黑线姬鼠
			++			++		++	++	++	++		++		黑线仓鼠、达乌尔黄鼠、黑线姬鼠
													+		小家鼠、黑线仓鼠

种 名	辽西低山丘陵及沿海平原区					辽东山地及半岛丘陵区								
	1 兴 城	2 锦 西	3 锦 县	4 北 镇	5 北 票	6 长 海	7 大 连	8 金 县	9 复 县	10 盖 县	11 宽 甸	12 凤 城	13 本 溪	14 桓 仁
33. 社鼠棘刺螨 <i>Hirstionyssus confucianus</i>														
34. 拟小棘刺螨 <i>Hirstionyssus sub-minor</i>														
35. 鼯棘刺螨 <i>Hirstionyssus mustelae</i>														
36. 柏氏禽刺螨 <i>Ornithonyssus bacoti</i>	++	++	++	++	++			++	++				++	++
37. 鸡皮刺螨 <i>Dermanyssus gallinae</i>	++	++			++									
38. 大连肋刺螨 <i>Steutonyssus dalianensis</i>							+							
39. 塔山巨刺螨 <i>Macronyssus tashanensis</i>		+												
40. 粪巨螯螨 <i>Macrocheles merdarius</i>			++						++					
41. 退色巨螯螨 <i>Macrocheles decoloratus</i>	++	++						++	++					
42. 家蝇巨螯螨 <i>Macrocheles muscaedomesticae</i>		++												
43. 光滑巨螯螨 <i>Macrocheles glaber</i>	+													
44. 地下异肢螨 <i>Poecilochirus subterraneus</i>														
45. 埋葬异肢螨 <i>Poecilochirus necrophori</i>														
46. 凹缘宽窗螨 <i>Euypparasitus emarginatus</i>														

注: +++表示数量多的种类,++表示普通种,+表示数量少的种类。

乌尔黄鼠与黑线仓鼠为优势鼠种。

本区革螨种类较多,共 26 种(表 1)。优势种为东北血革螨、仓鼠真厉螨及格氏血厉

续表 1

		辽河平原区							努鲁儿虎山脉北麓 黄土丘陵台地及西 辽河沙地区					主 要 宿 主	
15 新宾	16 清原	17 黑山	18 新民	19 沈阳	20 辽阳	21 鞍山	22 大洼	23 铁岭	24 建平	25 阜新	26 彰武	27 康平	28 昌图		
		++									++			东北鼯鼠、草原鼯鼠	
									+		+			草原鼯鼠	
									+		+			草原鼯鼠	
				++	++			++	++	++				褐家鼠	
									++	++			++	麻雀	
														蝙蝠	
														蝙蝠	
														甲 虫	
				++					++	++	++			达乌尔黄鼠、黑线仓鼠	
				++									++	蝇 类	
		+					+							鼠窝、鸡窝	
									+					达乌尔黄鼠窝巢	
											+			达乌尔黄鼠窝巢	
													+	达乌尔黄鼠窝巢	

螨。据在建平县的调查(1981),对在 108 个达乌尔黄鼠窝巢内所获革螨的分类数量统计,共获革螨 2513 只,其中东北血革螨 1107 只,占获革螨总数的 44.1%;格氏血厉螨 1001



只,占 39.8%; 仓鼠真厉螨 327 只,占 13.0%; 其它革螨共 78 只,占 3.1%。对采自黑线仓鼠体的 446 只革螨的统计,仓鼠真厉螨 363 只,占革螨总数的 81.4%; 格氏血厉螨 43 只,占 9.7%; 东北血革螨 6 只,占 1.4%; 其它革螨共 14 只,占 3.1%。东北血革螨宿主广,除上述两种鼠类外,还有五趾跳鼠、草原鼯鼠、小毛足鼠、长爪沙鼠等。

本区内多种革螨为其它区所未有的种类,如寄生于草原鼯鼠的巨腹赫刺螨、融赫刺螨、拟小赫刺螨,寄生于三趾跳鼠、小毛足鼠的半漠血厉螨、乌苏地厉螨以及寄生于黑线仓鼠、达乌尔黄鼠的北野血革螨、棉本血革螨等。

### 参 考 文 献

- 戴显声、李秉政等 1963 辽宁地区革螨。吉林医科大学学报 5(2): 333—45。  
 潘锦文、邓国藩 1980 蜱螨目革螨股。中国经济昆虫志 17 册。科学出版社。  
 李维贤等 1982 土厉螨属(厉螨科)在我国首次发现。动物分类学报 7(4): 377。  
 李维贤 1983 达乌尔黄鼠的寄生蜱螨及其种群数量变动的研究。动物学杂志 (4): 17—20。  
 李维贤 1983 辽宁省啮齿动物的地理区划。动物学报 29(4): 383—90。  
 李维贤、邓国藩 1985 巨刺螨属一新种。动物分类学报 10(1): 50—2。  
 李维贤 1987 辽宁省黑线鼯鼠与黑线仓鼠的寄生革螨调查。医学动物防制(1): 35—7。

## THE ECOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF GAMASIDES IN LIAONING PROVINCE

LI WEI-XIAN

(Liaoning Health and Anti-epidemic Station, Shenyang 110005)

An investigation on gamasides in Liaoning Province revealed that there are 46 species belonging to 5 families and 19 genera. Based on the characteristics of the topography and vegetation covering, Liaoning may be divided into four regions and the gamasides found in these regions can be enumerated as follows:

1. Liaoxi low mountainous region with hill and coastal plain: There are 20 species of gamasides in the region. *Eulaelaps cricetuli* and *Haemolaelaps glasgowi* are dominantes. *Macronyssus tashanensis* and *Coleolaelaps longisetatus* are rare species.

2. Liaodong mountainous region and peninsular hill: There are 22 species of gamasides in the region. *Eulaelaps cricetuli* and *Haemolaelaps glasgowi* are dominantes in the peninsular hill region. *Laelaps jettmari*, *Eulaelaps dongfangis* are dominantes in the Liaodong mountainous region. *Haemogamasus serdjukovae*, *Haemogamasus dauricus*, *Seatonysus dalinensis* and *Haemolaelaps triangularis* are rare species.

3. Liao-River plain: There are 20 species of gamasides in the region. *Laelaps jettmari* and *Eulaelaps stabularis* are dominantes. *Ololaelaps ussuriensis* is rare species.

4. Northern foot-region of Nuluerhu mountain and western Liao-river sandy: There are 26 species of gamasides in the region. *Haemogamasus mandschuricus*, *Eulaelaps cricetuli* and *Haemolaelaps glasgowi* are dominantes. *Hirstionysus ventricosus*, *Hirstionysus mustelae*, *Hirstionysus sub-minor*, *Haemolaelaps semidesertus*, *Dipolaelaps absunaris*, *Haemogamasus kitanoi* and *Haemogamasus kusumotoi* are rare species.

**Key words** gamasides of Liaoning—ecogeographical distribution